



UŠIVOST – NEPRIJETNA NADLOGA

KAJ JE ZNAČILNO ZA POJAVLJANJE UŠIVOSTI IN KAKO SE JE LAHKO ZNEBIMO?

Ušivost je kožna nalezljiva bolezen, razširjena po vsem svetu. Izbruhi se najpogosteje pojavljajo v otroških predšolskih in šolskih kolektivih ter zavodih. Rezervoar je človek. V Sloveniji opazamo v glavnem naglavne uši, ki živijo na lasišču, redkeje pa tudi na obrveh in trepalnicah. Povzročajo mnoge neprijetnosti, predvsem srbenje lasišča, kot posledice praskanja pa opraskanine lasišča, kraste ter naknadne gnojne okužbe. Okužba s telesnimi (oblačilnimi) in sramnimi ušmi je mnogo redkejša.

Glavna pot prenosa je direktni stik z okuženo osebo, menjanje in nošenje delov oblačil (kape, šali), telesne uši pa se lahko prenašajo tudi preko posteljnine ali skupnih oblačil. Tako naglavne kot telesne uši lahko preživijo brez hrane približno sedem do deset dni.

Razvojni ciklus uši ima tri oblike: jajčece (gnido), nimfo in odraslo uš. Za vzdrževanje razvojnega ciklusa uši je potrebna temperatura 32° C. Jajčeca naglavne uši se ne razvijajo, če je temperatura nižja od 22° C. V ugodnih pogojih se iz jajčec razvijejo v 7 do 10 dneh nimfe, iz teh pa v 7 do 13 dneh odrasle uši, ki lahko zopet ležejo jajčeca. Razvojni ciklus naglavne in telesne uši traja torej v povprečju 18 dni, odrasle uši pa živijo okoli mesec dni.

UKREPI ZA OBVADOVANJE UŠIVOSTI

- Izrednega pomena je zgodnje odkritje in uničenje jajčec in odraslih uši.
- Omejimo neposreden stik z okuženo osebo.
- Otrokom je potrebno redno vsakodnevno pregledati lasišča.
- Če se uši pojavijo v šolskem kolektivu, je potrebno obvestiti vodstvo šole in nato vse starše v prizadetih skupinah ali razredih.
- Odrasli naj vsaj dvakrat tedensko pregledajo lasišča otrok.
- Ob pojavu ušivosti pri osebi se morajo pregledati za ušivost tudi družinski člani in tesni kontakti. Izrednega pomena je, da poteka zdravljenje vseh okuženih oseb hkrati.
- Posteljnino, vzglavnike, pokrivala, moramo nujno oprati na temperaturi vsaj 60°C.
- Prostore pogosto presesamo in ne smemo pozabiti na oblazinjeno pohištvo, preproge, odeje, mehke plišaste igrače in tudi avtomobilske sedeže, kamor smo lahko zanesli odrasle uši. Ker lahko zdržijo brez hrane dlje časa, moramo pomisliti na vse kotičke, kjer se lahko zadržujejo.

ZDRAVLJENJE

Uporaba enega izmed preparatov, ki so na tržišču, po navodilu proizvajalca in uporaba glavnikov za prečesavanje;

POZOR

Noben preparat ni 100% zanesljiv, zato je pogosto potrebno postopek razuševanja po 7 do 10 dneh ponoviti.